


CUIDADOS GENERALES

- El niño operado debe permanecer en reposo, durante las primeras 24 horas.
- Al llegar a su casa iniciará la alimentación con líquidos claros. En la tarde comerá una dieta suave y al día siguiente su alimentación corriente.
- Para aliviar el dolor dar acetaminofén, tempra (supositorios, líquido o tableta).según orden médica
- Vigilar en casa por fiebre por más de 48 horas y por sangrado activo en la herida quirúrgica.



Elaborado por:
Licda. Amelia Bonilla

Revisado por
División de Docencia

Teléfono: 512-9813 ext. 149

HOSPITAL DEL NIÑO DIVISION DE ENFERMERIA SALA DE RECOBROS



CUIDADOS POST OPERATORIOS PACIENTES CON CIRUGIA AMBULATORIA




HERNIORRAFIA

Si la herida tiene un apósito transparente, el mismo protege la herida y no necesita curaciones. Se quita al retirarse los puntos en la consulta externa.

Observa la herida por signos de infección (enrojecimiento, endurecimiento, salida de pus, calor en el área).

Los puntos se cortan 8 días después de la cirugía, por el médico Cirujano o en el Centro de Salud.

Lavar la herida con agua y jabón después que se haya retirado el apósito transparente.



CIRCUNCISION

- Vigile por:
 - Sangramiento (sangre roja)
 - Infección (enrojecimiento, calor local, pus o fiebre).
- Si se ha usado plastibel:
 - No tratar de retirarlo
 - Se debe caer solo.
 - Después de 8 días el médico debe retirarlo.
- Si tiene suturas:
 - Evite que se toque.
 - Si tiene un apósito: retire suavemente, humedeciéndolo, si se moja con orina.
 - Las suturas se caen solas.
 - * Puede bañarse en bañera o regadera cuando lo tolere; no debe restregarse el área de la cirugía.
 - * Debe mantenerse seco.

QUISTE TIROGLOSO

Si un niño tiene un drenaje cubierto con grasa debe cambiar las gasas, siempre que estén muy manchadas con secreción sanguinolenta.

Vigilar por sangrado activo (sangre roja, brillante).



Vigilar por signos de infección (enrojecimiento, fiebre, calor local).