

## POST CIRUGÍA DE CATARATAS Y TRANSPLANTE CORNEAL

1. Evitar frotarse los ojos.
2. Mantener limpieza palpebral.
3. Evitar esfuerzos físicos.
4. Usar protector plástico solo al dormir y durante el día usar lentes de sol.

Habrá enrojecimiento ocular sensación de cuerpo extraño, lagrimeo.

### SONDAJE LAGRIMAL

Produce pocas o ninguna molestias pos-operatorias, puede haber aumento de sensibilidad sobre el área y las lagrimas pueden ser sanguinolentas.

### POST OPERATORIO DE CHALAZIO

Habrá edema palpebral sensibilidad del párpado y en pocas ocasiones pequeña equimosis.

### ¿QUÉ DEBE SABER?

- Todo prematuro que este en el grupo de riesgo para presentar retinopatía del prematuro debe ser evaluado por oftalmología.
- Todo niño con problemas de estrabismo, leucocoria (pupila blanca)
- deben ser evaluados por un oftalmólogo.
- El desarrollo de la función visual se va a determinar en los primeros años de vida de niño.
- Todo defecto en la infancia sea llamativo o no, deben ser diagnosticado y tratado precozmente

#### Elaborado por:

Licda. Mitzila Díaz

Licdo. Eduardo Rodríguez

#### Revisado por

División de Docencia

**HOSPITAL DEL NIÑO**  
DIVISION DE CIRUGIA  
SALA DE RECOBROS



### CUIDADOS POSTOPERATORIOS DEL PACIENTE CON CIRUGÍA DE OJOS



**ESTRABISMO, CIRUGÍA DE  
CATARATA, SONDAJE DEL  
CONDUCTO LAGRIMAL,  
TRANSPLANTE DE CORNEA,  
CHALAZIO**

[www.hden.sld.pa](http://www.hden.sld.pa)  
2006

## **CUIDADOS GENERALES DEL PACIENTE DE CIRUGIA DE OJO**

Después de la cirugía el paciente debe permanecer una hora en ayuno, (no debe ingerir alimento alguno).

- Al llegar a su casa, iniciará su alimentación con líquidos.
- En la tarde una dieta suave y al día siguiente su alimentación normal.
- Para aliviar el dolor y molestias dar acetaminofen, tempra supositorio o vía oral cada cuatro horas o cada seis horas en las dosis indicadas por el médico.
- El niño operado debe permanecer en reposo relativo durante las primeras 24 horas.

Los Post Operados de Catarata y transplante de Cornea no deben realizar ningún tipo de esfuerzo físico, fuerza brusca, trabajos fuertes, largas caminatas, no colocarse con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba.




- Cumplir estrictamente con el tratamiento ordenado
- Lavar las manos antes de aplicar el tratamiento.
- No frotar los ojos.
- De tener protector no retirarlo de los ojos, sin autorización del médico.
- Los niños que son de edad escolar no pueden realizar ejercicios fuertes por tres semanas, si han sido operados de catarata o transplante corneal.
- Solicitar la constancia para llevarla al colegio

- médico tratante le entregará recetas para sus medicamentos.
- La cita de control generalmente es para el día siguiente.
- No pueden ver televisión en exceso (solo por un tiempo corto).

Puede tener visión borrosa por lo que debe ser vigilado por un adulto

## **Diagrama del Ojo**



## **POST OPERADOS DE ESTRABISMO**

- Evitar frotarse los ojos
- Mantener limpieza palpebral
- Habrá enrojecimiento ocular, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo; síntomas que deben mejorar al pasar los días.