

COMO UTILIZAR EL ESPACIADOR CORRECTAMENTE

Se debe realizar de manera cuidadosa, sin lastimar al bebe


- Se agita el medicamento antes de inhalar y se conecta a la boquilla
- Se coloca el espaciador sobre la nariz y boca.
- Se aplica el medicamento **puff (apretar y soltar)** se cuentan 10 segundos.
- Se retira el espaciador de la cara del bebe.
- Si están indicados otro puff se esperan 5 segundos y se repite el procedimiento.

COMO HACER UN ESPACIADOR EN CASA:

Puede hacerlo con una botella plástica de agua o Soda desechable de ½ litro o 1 litro.

Medir 15 cm desde el cuello al fondo y cortar sobre la nariz para que se adapte, forrar los bordes y adaptar el inhalador a la boca y nariz.

**LA LECHE DE TU PECHO ES EL MEJOR ALIMENTO PARA PROTEGER A TU BEBE.
Otras fórmulas de leche serán indicadas por tu Médico Neonatólogo**



EL ESPACIADOR DEBE SER LAVADO CADA SEMANA, CON AGUA Y JABÓN



**HOSPITAL DEL NIÑO
DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGÍA
CLÍNICA DE SEGUIMIENTO NEONATAL
DISPLASIA BRONCOPULMONAR**

EL MANEJO DEL BEBÉ CON DISPLASIA BRONCOPULMONAR EN CASA

USO DE INHALADORES



2014

INFORMACIÓN PARA PADRES

MEDICAMENTOS UTILIZADOS COMO UTILIZAR EL ESPACIADOR CORRECTAMENTE Y HACER UNO EN CASA

MEDICAMENTOS UTILIZADOS

¿Qué necesito saber para cuidarlo bien cuando va a casa?

- Conocer que los medicamentos necesitan a su salida, y que utilizara en casa por algún tiempo.
- Utilizar correctamente el espaciador de los inhaladores, cómo limpiarlo y saber cómo se hace uno en la casa.

INHALADORES DE SALBUTAMOL Y BECLOMETASONA

BECLOMETASONA

Corticoide inhalado (antiinflamatorio).

Máxima dosis 2 puff cada 8 horas. Se utilizara por varios meses seguidos y será suspendida por indicación médica.


SALBUTAMOL

Broncodilatador

Uso según dosis ordenada por el médico y se aplica primero que la beclometasona. Su mal uso puede causarle vómito, irritación y taquicardia (palpitaciones).



Cómo funcionan los medicamentos



MEDICAMENTOS ORALES:

Se utilizan diuréticos (**HIDROCLOROTIAZIDE O FUROSEMIDA**) durante los primeros meses: hacen que salga el líquido que se queda en los pulmones y hacen orinar abundante y frecuentemente al bebe. Las Vitaminas y el hierro deben ser ofrecidos en las mañanas antes del baño.

Los diuréticos que toma tu bebe deben ser preparados cada 7-10 días en la farmacia. Puedes usar **GOTERO** o una Jeringuilla, para dar el medicamento. Si tienes dudas sobre cómo usarlos consulta con la Enfermera de Seguimiento y solicita nuevamente una demostración

Siempre tenga un inhalador de reserva y nunca espere que se acabe uno para conseguir el siguiente.

La duración del inhalador depende de las dosis ordenadas por el Médico.