

- Si es sangrado es rojo brillante o vivo debe acudir a la instalación de salud más cercana y comunicar que fue operado.
- Observe por fiebre alta 38°C, por signos de infección, enrojecimiento, hinchazón, calor local.
- Evite hacer actividad física por un mes así como educación física si está en periodo escolar.
- Solicite incapacidad física o constancia escolar para presentar en el colegio o comunicar al mismo que fue operado.
- Mantenga al día sus vacunas y acuda a sus citas control de crecimiento y desarrollo con su doctor.

PRÓXIMA CITA

Nombre Completo del Paciente

N° de expediente

Fecha: _____

Doctor _____

Bibliografía

- <https://www.chikd.org> Quiste del conducto tirogloso en los niños
- <https://www.healthychildren.org> Cirugía de tiroides en niños

Elaborado por: Lic. Mitzi Ramos

Revisado por:
Docencia Médica.
Docencia de Enfermería.


REVISIÓN 2024



**HOSPITAL DEL NIÑO
DR. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL**

**Departamento de Docencia
Docencia de Enfermería
Sala de Recobro**

**Cuidados de la Cirugía
RESECCIÓN DE QUISTE
TIROGLOSO**




2024

Quiste Tirogloso

Es una bolsa llena de líquido en la parte delantera del cuello.

Se forma a partir de tejido sobrante del desarrollo de la glándula tiroidea cuando se estaba formando el embrión.



Se realiza un corte a nivel del cuello para poder retirar el quiste



CUIDADOS

POST- OPERATORIOS

(Luego de la resección del quiste)

- Puede tener un poco de dolor al tragar que debe resolverse en pocos días.
- Administrar medicamentos para el dolor ordenado por el médico.
- Ofrecer líquidos fríos hasta que tolere su dieta blanda o corriente.
- Se tiene un drenaje o pequeño tubo en el cuello que estará cubierto con gasas, no debe de tocarlo ni retirarlo; sólo si el médico indica cambiar las gasas de afuera.
- Se puede observar una ligera salida de líquido en el área de un color ámbar o rojo claro.