



- Vigile la herida por enrojecimiento o salida de pus.
- Realice la higiene de la herida con agua y jabón, seque con un paño exclusivamente para la herida, luego de retirar los apósitos (gasas) puesta en la herida.
- Mantenga reposo relativo; que significa caminar en casa, no mantenerse en cama todo el día y el tiempo en el que se está acostado mantenerse con respaldo.
- No hacer fuerza al expulsar gases.
- Si está en periodo escolar pedir constancia con la secretaria del salón de operaciones o al médico tratante.
- Mantenga las vacunas al día.
- Acuda al control (cita) luego de la cirugía según indicación médica.
- Usar ropa holgada.

### PRÓXIMA CITA

**Nombre Completo del Paciente**

\_\_\_\_\_

**Nº de expediente**

\_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Doctor** \_\_\_\_\_

**Bibliografía:**

[https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp\\_imagepages/1109.htm](https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/1109.htm)

**Elaborado por:**

**Lic. Mitzi Ramos**

**Revisado por:**

Docencia Médica

Docencia de Enfermería.

**REVISIÓN 2024**



**HOSPITAL DEL NIÑO  
DR. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL**

**Departamento de Docencia  
Docencia de Enfermería  
Sala de Recobro**

## **Cuidados de la Cirugía Laparoscópica**





Cirugía laparoscópica

**2024**

## Laparoscopia

Es un procedimiento que se usa para revisar y realizar cirugías en área pélvica y abdominal. Una de sus ventajas es que es menos invasiva, esto significa que emplea una incisión pequeña en el abdomen y permite una recuperación más rápida que una cirugía abierta.



## CUIDADOS POST-OPERATORIOS (luego de la cirugía)

- Ofrezca los medicamentos para el dolor indicado por el médico.
- El dolor puede durar unos días y es posible que lo sienta en sus hombros debido a un gas llamado dióxido de carbono en su abdomen.
- No tome ninguna bebida carbonatada (refrescos/sodas) por unos días después del procedimiento para evitar que contribuya al aumento del dolor.
- Se recomienda tomar líquidos claros (agua, jugo de manzana, arándano, uva, consomé, gelatina, agua de arroz) luego de 3 a 5 horas luego de la cirugía.
- Evite que el niño realice ejercicios o esfuerzo físico.