

CUIDADOS POSTOPERATORIOS (luego de la cirugía)

- La higiene oral en el niño pequeño se le debe realizar pasando por las encías una gasa o algodón limpio.
- La herida debe cicatrizar en una semana (7 días).
- Acuda a su cita de control designada luego de la cirugía.
- Mantenga las vacunas al día.



PRÓXIMA CITA

Nombre Completo del Paciente _____

Nº de expediente _____

Fecha: _____

Doctor _____

BIBLIOGRAFÍA

Edurne Domo. Frenillo lingual corto. Mi bebé y yo.
<https://mibebeyyo.mx/enfermedades/enfermedades-bebes/frenillo-lingual-corto-1904>
Avodent.com frenectomía: que es y cuando está indicada. www.
Avodent.com

Realizado por: Lic. Mitzi Ramos

Revisado por:
Docencia Médica.
Docencia de Enfermería.

REVISIÓN 2024




**HOSPITAL DEL NIÑO
DR. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL**

Departamento de Docencia
Docencia de Enfermería
Sala de Recobro

Cuidados de Cirugía de OTORRINOLARINGOLOGÍA

FRENECTOMÍA LINGUAL





ANTES

DESPUÉS

2024

Frenillo

Es una banda que sujet a la parte inferior de la lengua y la parte inferior de la boca; su anormalidad impide que la lengua se mueva libremente afectando la masticación y la pronunciación



Frenillo

Frenectomía lingual

Es una mínima incisión de manera que pueda corregirse la posición habitual del frenillo o en caso de anquilosis (frenillo corto) cortar el tejido para que facilite el movimiento lingual; posteriormente se da unos puntos de sutura para cerrar la herida.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS (luego de la cirugía)

- Puede comer alimentos con normalidad (alimentos sólidos después de transcurridos 4 a 6 horas).
- Evite ofrecerle alimentos calientes, cítricos o comidas con demasiadas especias para evitar la inflamación de la herida.
- No permita que el niño se meta a la boca objetos que puedan dañar la herida como juguetes, chupetes, mamilas, carrizos.
- La higiene oral debe ser realizada por un adulto que deberá cepillar los dientes con cuidados, tras cada comida.