



ALGORITMO DE MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN



1 **PACIENTE CON EXANTEMA FEBRIL EN TRIAGE**
Identificar al paciente con cuadro de exantema febril desde el Triage, debe darse atención inmediata.

SÍNTOMAS CLÁSICOS DEL SARAMPIÓN:

- FIEBRE ALTA** (>38.5 °C)
- EXANTEMA** (ERUPCIÓN EN LA PIEL QUE INICIA EN LA CARA Y SE EXTIENDE AL CUERPO)
- TOS**
- RINORREA** (CONGESTIÓN NASAL)
- CONJUNTIVITIS** (OJOS ROJOS Y LAGRIMEO)

2 **COLOCAR MASCARILLA QUIRÚRGICA**
Al paciente (solo para mayores de 2 años) y al familiar de forma inmediata. Colocar paciente en área designada para casos sospechosos de sarampión en urgencias.

3 **EL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE EL CASO**
Deberá utilizar **Respirador N95** o equivalente correctamente ajustado y bata de protección desechable como mínimo para atención segura.

4 **LLENADO DE FORMULARIOS Y TOMA DE MUESTRAS**

- Tubo de serología con 5ml de sangre
- Muestra de orina
- Hisopado nasofaríngeo en medio de transporte viral

ENVIAR LAS MUESTRAS EN FRÍO, ACOMPAÑADAS DE FORMULARIOS COMPLETOS.

NOTIFICAR A:

- Infectología
- Epidemiología
- Unidad de prevención y control de infecciones
- Administrativo de turno

5 **¿PRESENTA COMPLICACIONES AGUDAS QUE REQUIERAN HOSPITALIZACIÓN?**

NO → **SÍ**

MANEJO AMBULATORIO CON RECOMENDACIÓN DE MANTENERSE EN CASA.

ADMITIR EN ÁREA DE AISLAMIENTO DESIGNADA PARA CASOS SOSPECHOSOS.

6 **RESULTADO DE IgM DEL LABORATORIO CLÍNICO**

7 **POSITIVO**
REUBICAR EN SALA DE AISLAMIENTO PARA CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPIÓN.

NEGATIVO
REUBICAR EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL*

*Si la IgM se tomó dentro de las 72 horas de inicio del exantema podría ser un falso negativo. Tomar nueva muestra luego de las 72 horas del exantema antes de tomar decisión.

ATENCIÓN



¿TIENES ALGUNO DE ESTOS
SÍNTOMAS?



FIEBRE ALTA



BROTE EN LA PIEL QUE
INICIA DESDE LA CARA

ACOMPAÑADO DE



TOS



OJOS ROJOS
Y LAGRIMEO



CONGESTIÓN
NASAL

PODRÍAS TENER **SARAMPIÓN**



AVISA DE INMEDIATO
AL PERSONAL DEL HOSPITAL
PARA PROTEGER TU SALUD
Y LA DE LOS DEMÁS.



USA TU MASCARILLA
CUBRE TU NARIZ Y BOCA
EN TODO MOMENTO
(solo para mayores de 2 años)



TU COLABORACIÓN
HACE LA DIFERENCIA
¡GRACIAS POR CUIDARNOS A TODOS!



CUIDÉMONOS. PREVENGAMOS EL SARAMPIÓN.





IMPORTANTE

EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EL SEGURIDAD QUE SE ENCUENTREN EN LA ENTRADA DEBEN MANTENERSE CON RESPIRADOR N95, BIEN COLOCADA, CON AMBAS TIRAS COLOCADAS Y CON BUEN SELLO EN LA CARA.

USO CORRECTO DEL N95



Ambas tiras colocadas



Bien ajustada al puente nasal



Verificar buen sello en la cara

1 PREGUNTAR ¿PORQUÉ VIENE?

- Si tiene fiebre alta, brote en la piel que inicia desde la cara; acompañado o no de tos, congestión nasal, lagrimeo y ojos rojos.



FIEBRE ALTA



BROTE EN LA PIEL (inicia desde la cara)



TOS



CONGESTIÓN NASAL



LAGRIMEO Y OJOS ROJOS

2 SI SE IDENTIFICA PACIENTE

Colocar mascarilla quirúrgica a paciente (solo para mayores de 2 años) y acompañante.



Paciente y acompañante con mascarilla quirúrgica.

3 AVISAR A ENFERMERÍA EN TRIAGE

y llevar paciente a consultorio número 3.

